

Palmo - plantarne keratodermije

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog

utorak, 27 mart 2012 00:08 - Poslednje ažurirano utorak, 27 mart 2012 00:14



Palmo-plantarne keratodermije su grupa nasljednih ili stečenih oboljenja, koja se odlikuju zadebljanjem kože dlanova i tabana. Ovaj oblik keratodermija može da se javi kao izolovani poremećaj ili kao jedan od znakova u sklopu drugih oboljenja, kao na primjer kod nekih genodermatoza ili metaboličkih poremećaja.

One mogu da se jave u sklopu nekih oboljenja kože kao što su, psorijaza, pityriasis rubra pilaris, lichen ruber planus, sekundarni sifilis i neke druge dermatoze, zato je potrebno uzeti detaljnu anamnezu i pažljivo pregledati ostalu kožu u potrazi za znakovima koji mogu ukazati na neka od ovih oboljenja. Takođe, stečene keratodermije mogu biti jedna od kožnih manifestacija malignih oboljenja unutrašnjih ograna.

Palmo - plantarne keratodermije

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog

utorak, 27 mart 2012 00:08 - Poslednje ažurirano utorak, 27 mart 2012 00:14



Najčešće se pojavljuje u obliku simetričnih, obojenih, prstima, dlanovima i potplacima, u obliku faza okoštavanja. Spoljenje