

Hidradenitis suppurativa

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić, spec. dermatovenerolog
četvrtak, 21 jul 2016 01:00 - Poslednje ažurirano četvrtak, 21 jul 2016 17:52



Ovo oboljenje se još zove *Akne inversa*, i dosta je često kod mlađih osoba sa prvim pojavama u pubertetskom periodu. Najčešće su zahvaćene apokrine znojne žlijezde, koje su lokalizovane, ispod pazuha, na preponama, ispod grudi.

Oboljenja počinje sa bolnim čvorićima obično ispod pazuha ili na preponama, koji počinju da izlučuju gnojni sadržaj, bolni su na dodir a sekrecija može da traje danima. Upalni proces traje duži vremenski period a pojedini upalni čvorići mogu da zarastu uz ostajanje rezidualnih ožiljaka.

Najčešće se uzrok ovih promjena navodi, emocionalni stres, hormonalni disbalans, kao i pojedine grupe oboljelih osoba. Oboljenje ima dugotrajan i recidivantan karakter, a zbog stvaranja ožiljnih promjena, i komunikacionih sinusa između upaljenih žlijezda vrlo često se moraju izvoditi i češći operativni zahvati što oboljele dodatno traumatizira stvarajući kliničku sliku još težom.

Oboljeli vrlo često dolaze kasno na liječenje usled ne postavljanja prave dijagnoze i samoliječenja od strane oboljelih jer je oboljenje kako hronične prirode tako i toka.

Hidradenitis suppurativa

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić, spec. dermatovenerolog
četvrtak, 21 jul 2016 01:00 - Poslednje ažurirano četvrtak, 21 jul 2016 17:52

Imajući u vidu da se oboljenje češće lokalizuje na aksilama, preponama, perianalno i uglavnom na intertriginoznim područjima, koja su obrasla dlakama, vjeruje se da pojačano znojenje, hormoni (pubertet), androgena disfunkcija i genetski poremećaji mogu biti uzrok oboljenja.

Faktori koji pogoršavaju oboljenje su: rad u vlažnoj i pretoploj sredini, oralna kontracepcijska sredstva, gojaznost, dezodoransi na bazi alkohola, depilacija, razne iritacije i hemijski preparati za depilaciju i period prije menstrualnog ciklusa.

Oboljenje se na osnovu kliničke slike može podijeliti u tri stadijuma; prvi stadijum je najblaži i on se uglavnom liječi bez komplikacija a manifestuje se crvenim i bolnim nodusima koji na terapiju i otklanjanjem potencijalnog uzroka se brzo sanira.

U drugom stadijumu se pojavljuju uz inflamaciju i apscesi i oni uglavnom zahtjevaju drenažu i operativni tretman, dok u trećem stadijumu upalni proces je difuzan uz stvaranje komunikacionih sinusa sa sekrecijom veće količine gnojnog sadržaja a parcijalna izliječenja ostavljaju i ožiljne promjene koje ponekad mogu otežavati pokrete u zahvaćenim regijama.

Kod trećeg stadijuma komplikacije su najčešće u vidu ožiljaka koji ometaju normalno kretanje, a lokalizuju se na preponama i pazušnim regijama, anemija, limfedem, lokalne ili sistemske infekcije.

Liječenje je u domenu, dermatologa, endokrinologa, ginekologa i hirurga