

Enterovirusna oboljenja

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić, spec. dermatovenerolog
četvrtak, 13 oktobar 2016 00:00 - Poslednje ažurirano četvrtak, 13 oktobar 2016 19:24



Ova grupa virusa se svrstavaju u grupu picornoviridae, a uzrokuju banalne infekcije do vrlo ozbiljnih bolesti. Trenutno dijagnosticiranje i liječenje ovih oboljenja je na vrlo visokom nivou u odnosu prije nekoliko godina kad je znanje o ovim oboljenjima bilo vrlo oskudno.

Oboljenja uzrokovana enterovirusima mogu se pojaviti u svim zemljama svijeta, najčešće se javljaju tokom letnog i jesenjeg perioda gdje su područja sa umjerenom klimom. Oboljenja se prenose fekalno – oralnim putem, zagađenom vodom u javnim bazenima i sa čovjeka na čovjeka.

Sama infekcija se širi među bliskim članovima porodice, u kolektivnim boravištima a najosjetljivija populacija za ova oboljenja su djeca od 4 do 12 godine.

Oboljenje traje do 7 dana uz blage simptome a kod nekih osoba sa smanjenim imunitetom mogu trajati i duže uz težu kliničku sliku sa pratećim tegobama kao što su,

bolest šaka, usta i stopala

, herpangina, visoka temperatura i opšte teško stanje oboljeloga.

Oboljenje može zahvatiti više osoba u kolektivnim druženjima ali vrlo rijetko da svi imaju istu kliničku sliku oboljenja.

Nakon ulaska u tijelo virus zahvata sluznicu ždrijela, probavnog trakta i žlijezdano tkivo, a hematogeno se širi u ostale dijelove tijela.

Oboljenje može proći sa blažom i težom kliničkom slikom.

Enterovirusna oboljenja

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić, spec. dermatovenerolog
četvrtak, 13 oktobar 2016 00:00 - Poslednje ažurirano četvrtak, 13 oktobar 2016 19:24

Blage kliničke manifestacije su febrilnost,
osip po tijelu,
faringitis, herpangina, konjuktivitis i
bolest šaka, usta i stopala.

Takođe se mogu pojaviti oblici oboljenja sa temperaturom I do 40 stepeni koja izmori oboljelog uz lose opšte stanje, koje traje nekoliko dana al prolazi bez posledica.

Jedan od najčešćih simptoma su laryngitis, febrilonost, gubitak apetita i opšta slabost praćena mučninom i povraćanjem.

Dok je herpangina karakteristična za enterovoroze a manifestuje se pojavom sitnih mjehurića koji se lokalizuju na krajnicima, nepčanim lukovima, faringsu, uglavnom je prati visoka temperature i teško opšte stanje oboljeloga.

Oboljenje traje uglavnom 3-5 dana kada se svi simptomi i tegobe povlače.

Bolest šake, stopala i usta

je
dosta česta manifestacija enteroviroza i lako se prepoznaje po mjehurićima u usnoj šupljini kao i papulama na šakama i stopalima, koje mogu preći u mjehuriće a kasnije i sitne kruste.

Djeca odbijaju da hodaju zbog bolova od promjena na stopalima, visoka temperature je uvijek prisutna, a oboljenje traje u prosjeku 3-5 dana.

Bronholmska bolest ili Pleurodinija je enteroviroza koja se manifestuje, bolovima u mišićima, grudima i gornjem dijelu stomaka.

Često je prisutno blijedilo i znojenje kod oboljelih. Može je pratiti povišena temperature često se zamjeni sa upalom pluća naročito od adolescenata.

U teže oblike enteroviroza ubrajamo, serozni meningitis, sindrom paralitičkog poliomijelitisa, encephalitis, kao i upalu srčanog mišića.

Enterovirusna oboljenja

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr Kristina Zrnić , spec. dermatovenerolog
četvrtak, 13 oktobar 2016 00:00 - Poslednje ažurirano četvrtak, 13 oktobar 2016 19:24

Liječenje enteroviroza je u domenu pedijatra i dermatologa.