



Bradavice (Verrucae)

Bradavice (Verrucae) su dobroćudne izrasline na koži i/ili sluzokožama.

Uzročnik je humani papilloma virus (HPV), DNA virus iz porodice Papovaviridae.

Nemaju lipoproteinski omotač, pa su veoma otporni na sapune, toplotu i isušivanje. Identifikovano je više od 150 tipova HPV. Tipovi 1, 2 i 4 HPV su uzročnici vulgarnih i plantarnih bradavica. Juvenilne ravne bradavice su uzrokovane tipom 3 i 10.

Učestalost iznosi 7-10 % u opštoj populaciji. Bradavice se najčešće javljaju između 10. i 19. godine, a nakon doba adolescencije učestalost opada.

Oboljenja izazvana humanim papiloma virusom

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr med Kristina Zrnic-Vranjes dermatovenerolog

Način prenošenja infekcije je direktnim ili indirektnim kontaktom sa zaraženom osobom, moguća je autoinokulacija. Kod deficitarnog imuniteta, nakon mikropovreda kože, korišćenja zajedničkih kupaonica, na bazenima, u fiskulturnim salama (plantarne veruke) veća je mogućnost obolijevanja. Virus inficira bazalne ćelije epiderma i podstiče njihovu diobu.

Inkubacija traje od 1 do 9 mjeseci. Na osnovu izgleda i lokalizacije veruka razlikujemo više kliničkih oblika.

Verrucae vulgares (obične, proste bradavice)

Ovo su pojedinačne ili multiple papule, na početku meke, a potom tvrde konzistencije, neravne, hiperkeratotične

Oboljenja izazvana humanim papiloma virusom

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog; Dr med Kristina Zrnic-Vranjes dermatovenerolog



Oboljenja izazvana humanim papiloma virusom (HPV) su vrlo česta grupa bolesti koju uzrokuju virusi iz porodice Papillomavirus. Uzroci oboljenja su virusi iz grupe HPV, od kojih je najčešći tip 6, a drugi su tipovi 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Ovi virusi se prenose putem kontakta sa kojom je virus prisutan. Često se pojavljuje na podlakticama, uključujući i pod kožom, ali može se pojaviti i na drugim delovima tijela. Oboljenje se obično pojavljuje u obliku wartyh ili kožnih ravnih lesija. U nekim slučajevima, virusi mogu uzrokovati težije oboljenja, uključujući precancerousne promjene u sluznicama u ženskim genitalijama i u mukozama u muškim i ženskim genitalijama. Uzroci oboljenja su virusi iz grupe HPV, od kojih je najčešći tip 6, a drugi su tipovi 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58. Ovi virusi se prenose putem kontakta sa kojom je virus prisutan. Često se pojavljuje na podlakticama, uključujući i pod kožom, ali može se pojaviti i na drugim delovima tijela. Oboljenje se obično pojavljuje u obliku wartyh ili kožnih ravnih lesija. U nekim slučajevima, virusi mogu uzrokovati težije oboljenja, uključujući precancerousne promjene u sluznicama u ženskim genitalijama i u mukozama u muškim i ženskim genitalijama.