

Sildenafil citrate

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog
četvrtak, 15 oktobar 2009 09:39 - Poslednje ažurirano subota, 23 januar 2010 16:17



Imajući u vidu nekontrolisano uzimanje ove supstance od skoro svih dobnih uzrasta, kako muškaraca, tako i žena kao poklon ili iznenađenje za svoje partnere, namjena ovog teksta je čisto informativna, ako već uzimate ovaj preparat ili imate namjeru da ga probate da nešto saznate o njegovom dejstvu i eventualnim posljedicama. To je hemijska supstanca koja vodi do širenja krvnih sudova, a kao efekat u korpusu kavernosumu utiče na pojavu i produženje erakcije kod muškaraca. Naravno, ako impotencija nije uzrokovana nekim drugim patološkim procesom u organizmu.

Način djelovanja

Sildenafil je supstanca koja ima efekat razlaganja jedne hemijske supstance u korpusu kaverzozumu penisa, tokom seksualnog stimulacije, kada njena koncentracija raste što ima za posljedicu erekciju koja je izazvana hemijskom supstancom uz direktni seksualni podržaj.

Indikacija za korištenje

Osnovna namjena supstance je impotencija kod muškaraca, kod kojih postoji nemogućnost nastajanja erekcije i njenog održavanja tokom seksualnog odnosa.

Način primjene supstance i njeno doziranje

Na osnovu dosadašnjih iskustava preporučena doza je 50 mg 1 sat prije seksualnog odnosa, tačnije seksualne aktivnosti. Doza može biti i 25 mg kao i 100 mg. Važno je napomenuti da se dnevno može koristiti samo jedna doza maksimalno do 100 mg. Kod starijih osoba (45 godina i više) potrebno je početi sa nižom dozom od 25 mg, s tim što se doza može povećavati, ali uz opravdan oprez zbog nus efekata. Supstanca se ne preporučuje osobama mlađim od 18 godina zbog neželjenih efekata. Tableta se uzima cijela sa malo tečnosti bez žvakanja

Kao i kod uzimanja drugih lijekova i ovde je prisutno uzimanje samoinicijativno različitih doza od pola do jedne četvrtine onako kako je "priatelj predložio". Naravno, što su doze manje komplikacije su blaže.

Neželjena dejstva supstance

Postoji veliki broj neželjenih dejstava na organozam koja su prolaznog karaktera, ali postoje zabilježeni slučajevi sa smrtnim ishodom, a komplikacije su veće što je doza lijeka veća. Od prolaznih tegoba najčešće se javljaju, glavobolja koja je prolaznog karaktera, crvenilo lica uslijed proširenja krvih sudova lica, vrtoglavica, poremećaj probave, otok nosne sluznice i otežano disanje na nos, poremećaj vida u vidu zamućenja slike, bolovi u mišićima.

Nakon puštanja supstance u promet zabilježena su sljedeća neželjena dejstva na organizam:

- alergijske reakcije, posebno kod osoba koje su preosetljive na osnovnu supstancu ili na ostale komponente koje se nalaze u tabletii,
- kod kardiovaskularnog sistema zabilježeni su slučajevi infarkta miokarda, anginepektoris, nagle srčane smrti, poremećaj rada srca, krvarenje u mozgu, smanjenja ili povećanja krvog pritiska.

Sildenafil citrate

Napisao Prof. dr Bogdan Zrnić, spec. dermatovenerolog
četvrtak, 15 oktobar 2009 09:39 - Poslednje ažurirano subota, 23 januar 2010 16:17

Takođe su zapažena i povraćanja, bol u očima i crvenilo, isto tako je zapažena i produžena erakcija.

Kontraindikacije za uzimanje supstance su:

- dokazana preosjetljivost, kod teških srčanih bolesnika, osoba sa teško oboljelom jetrom i bubrežima

Prije uzimanja vijagre potrebno je obavezan pregled doktora uz obaveznu anamnezu i klinički pregled kardiologa, posebno kod svih srčanih tegoba i najblažeg stepena. uzimanje supstance kod bolesnika sa ulkusom bolesti i poremećajem koagulacije nije opisana jer nema adekvatnih podataka što takođe traži oprez kod potencijalnih korisnika.

Važne napomene,

Preporučena doza je najčešće 50 mg, tableta se uzima 1 sat prije seksualne aktivnosti, susstanca izaziva erekciju samo ako postoji seksualno uzbudjenje, dejstvo supstance počinje od 30-60 min, a ako se uzima nakon obilnog obroka dejstvo do djelovanja se produžava, tse ne preporučuje konzumiranje alkohola prije uzimanja supstance, s obzirom na vrtoglavicu i poremećaj vida trebalo bi se kloniti vožnje automobila.

Supstancu treba uzimati samo originalnu, na zvaničnim prodajnim mjestima, nikako kod preprodavaca zbog raznih surogata, koja mogu izazvati razna neželjena dejstva